

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª RM-5ª DE
HOSPITAL-GERAL DE CURITIBA

PROVA ESCRITA PARA O PROCESSO SELETIVO AO EBST 2017

Nome: _____

Nº inscrição: _____

Nota: _____

- 1) A Vitamina K e a vacina contra a Hepatite B devem ser administradas num período específico da vida do recém-nascido, preferencialmente estabilizado. Marque a alternativa que possui o período correto:
 - a) Dentro de 24 horas do nascimento
 - b) Antes das primeiras 12 horas de vida
 - c) Nos primeiros 6 meses de vida
 - d) Após a alta hospitalar

- 2) A coleta de amostra de sangue de crianças para a realização de exames laboratoriais realizada pela punção do calcanhar pode causar algumas complicações. Marque a alternativa que possui a(s) possível(is) complicação(ões) da punção do calcanhar:
 - a) Infecção ungueal
 - b) Osteomielite e infecção de partes moles
 - c) Prurido intenso
 - d) Embolia gasosa e inflamação do leito ungueal

- 3) Segundo Mozachi (O Hospital, 2007), são sinais e sintomas de extravasamento, exceto:
 - a) Aumento da resistência à infusão
 - b) Edema
 - c) Eritema
 - d) Infecção

- 4) Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2009), em relação aos idosos, os fatores que levam a quedas consistem em uma combinação de aspectos relacionados com a saúde e riscos ambientais. Assinale a alternativa incorreta, quanto aos aspectos relacionados à saúde:
 - a) Condições que afetam o equilíbrio
 - b) Prejuízo cognitivo
 - c) Reações adversas a medicamentos
 - d) Iluminação inadequada

5) Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2009), em relação aos idosos, existem três condições comuns que afetam a cognição. Marque somente a alternativa que possui as três opções corretas:

- a) Mania, transtorno bipolar, depressão
- b) Delirium, esquizofrenia, transtorno bipolar
- c) Delirium, demência, depressão
- d) Demência, mania, esquizofrenia

6) Um dos cuidados essenciais ao paciente que possui um tubo orotraqueal, deve ser a observação de sinais e sintomas de necessidade de realização do cuidado da via aérea artificial. Marque a alternativa que não possui um sinal ou sintoma específico para o cuidado com a via aérea artificial:

- a) Fita suja ou solta no prendedor de via aérea artificial
- b) Irritação da pele ou feridas por pressão nas narinas, lábio ou canto da boca
- c) Tubo estável
- d) Secreções excessivas

8) Marque a alternativa na qual não consta um dos fatores de risco para o desenvolvimento de infecção no paciente com feridas:

- a) Fatores relacionados ao paciente
- b) Fatores relacionados ao ambiente de cuidado
- c) Fatores relacionados à lesão
- d) Fatores relacionados ao encurtamento da hospitalização

9) Segundo Knobel (Terapia Intensiva: Enfermagem, 2010), os pacientes devem ser classificados quanto ao risco para o transporte intra-hospitalar. Marque a alternativa que não corresponde a essa classificação:

- a) Baixo risco B
- b) Médio risco
- c) Baixo risco A
- d) Alto risco

10) Verifique se as afirmativas abaixo, referentes à classificação de risco para o transporte intra-hospitalar de pacientes graves são verdadeiras ou falsas e, em seguida, marque a alternativa com a sequência correta:

- () Baixo risco A – pacientes estáveis, sem alterações críticas nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigenoterapia
- () Baixo risco B – pacientes estáveis sem alterações críticas nas últimas 24 horas, porém que necessitam de monitoração eletrocardiográfica ou oxigenoterapia
- () Médio risco – Qualquer paciente em uso de droga vasoativa ou assistência ventilatória mecânica
- () Alto risco – Qualquer paciente em uso de drogas vasoativas, sedação e assistência ventilatória

- a) V, V, F, F

- b) V, V, V, V
- c) V, F, V, F
- d) F, F, V, V

11) Correlacione as idades abaixo às respectivas variações aceitáveis de frequência respiratória :

- 1) Adulto () 30 – 60 rpm
- 2) Criança () 12 – 20 rpm
- 3) Criança () 20 – 30 rpm
pequena (2 anos)
- 4) Recém – nascido () 25 – 32 rpm

- a) 1,2,3,4
- b) 4,1,2,3
- c) 3,2,1,4
- d) 4,1,3,2

12) Marque a alternativa que possui a definição correta para a hipotensão ortostática:

- a) É a hipotensão que ocorre quando uma pessoa hipotensa apresenta sintomas e pressão baixa ao se mover para uma posição mais elevada
- b) É a hipotensão que ocorre quando uma pessoa normotensa apresenta sintomas e pressão baixa ao se mover para uma posição mais elevada
- c) É a hipotensão que ocorre quando uma pessoa hipertensa apresenta sintomas e pressão baixa ao se mover para uma posição mais elevada
- d) É a hipotensão que ocorre quando uma pessoa normotensa apresenta sintomas e pressão baixa ao se mover para uma posição menos elevada

13) Marque a alternativa que possui aos cinco setores que , minimamente, os Centros de Materiais e Esterilização classes I e II devem possuir:

- a) Recepção e limpeza; Preparo e esterilização; Desinfecção física, quando aplicável; Local para monitoramento do processo de esterilização; Armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados
- b) Recepção e limpeza; Preparo e esterilização; Desinfecção química, quando aplicável; Local para monitoramento do processo de esterilização; Armazenamento e distribuição das próteses limpas
- c) Recepção e limpeza; Anteparo e esterilização; Desinfecção química, quando aplicável; Local para monitoramento do processo de esterilização; Armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados
- d) Recepção e limpeza; Preparo e esterilização; Desinfecção química, quando aplicável; Local para monitoramento do processo de esterilização; Armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados

14) Marque a alternativa que possui as atribuições do técnico de enfermagem no Centro de Materiais e Esterilização (CME):

- a) Exerce atividades de nível médio, previstas no POP, sob orientação e supervisão do enfermeiro

- b) Realiza a distribuição de materiais esterilizados, somente com a ordem da instituição
- c) Executa somente a desinfecção de artigos críticos
- d) Exerce atividades de nível médio, previstas no POP do setor

15) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é direito do técnico de enfermagem:

- a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade
- b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica
- c) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos
- d) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.

16) O manual tem por finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações de enfermagem, constituindo um instrumento de consulta. O conteúdo do manual é determinado pela necessidade de informação existente, na unidade onde será implantado. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita quanto a definição específica de regulamento, regimento, normas, rotinas e procedimentos, marcando a alternativa com a sequência correta:

- | | |
|------------------|---|
| 1) Regulamento | () Conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização, que são utilizados no desenvolvimento das atividades |
| 2) Regimento | () Conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas |
| 3) Normas | () Ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula e amplia o estatuto, para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais. Contém as diretrizes básicas da organização de saúde |
| 4) Rotinas | () Ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem |
| 5) Procedimentos | () Descrição detalhada e sequencial de como uma atividade deve ser realizada. |

- a) 3,4,1,2,5
- b) 2,4,3,1,5
- c) 1,2,4,5,3
- d) 4,2,1,5,3

17) O paciente tem alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) pelo anestesiológico, indo para a unidade de destino, após a avaliação de alguns parâmetros, dentre eles está a Escala de Aldrete e Kroulik, que deve pontuar entre:

- a) 10 e 12 pontos
- b) 6 e 10 pontos
- c) 13 e 15 pontos
- d) 8 e 10 pontos

18) Suspensão é a proibição do exercício profissional de Enfermagem, este ato, não pode ser superior a um prazo de:

- a) 29 dias
- b) 60 dias
- c) 30 dias
- d) 15 dias

19) Foi prescrita a dose de 20 mg de Gentamicina, a Farmácia Hospitalar dispensou uma ampola de 2 ml com 80 mg. Quantos mililitros devem ser aspirados desta ampola para que a dose prescrita possa ser administrada?

- a) 1,5 ml
- b) 0,5 ml
- c) 0,25 ml
- d) 1,0 ml

20) Para administrar 1000 ml de soro glicosado a 5% em 12 horas, o número de microgotas por minuto é de:

- a) 28 microgotas/minuto
- b) 83 microgotas/minuto
- c) 100 microgotas/minuto
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

21) O paciente pode assumir várias posições durante o seu exame físico, para a realização de procedimentos ou mesmo para melhor estabelecer o seu conforto. Sendo assim, enumere os parênteses correlacionando os tipos de posicionamento de um paciente com a respectiva descrição e marque a sequência correta.

(1) Litotômica (2) Trendelenburg (3) Sims (4) Genu-peitoral

- () Decúbito dorsal, pernas afastadas com joelhos fletidos e superfície plantar sobre a cama.
- () Decúbito lateral esquerdo com perna direita fletida sobre a perna esquerda.
- () Paciente ajoelhado com membros inferiores afastados, peito sobre a cama e cabeça lateralizada.
- () Decúbito dorsal, em plano inclinado de forma a manter a cabeça mais baixa em relação ao corpo.

- a) 1, 2, 4, 3.
- b) 2, 1, 4, 3.
- c) 1, 3, 4, 2.
- d) 2, 1, 4, 2.

22) É contraindicada a aferição de pressão arterial no membro que possua:

- a) Petéquias.
- b) Fístula arteriovenosa.
- c) Equimoses.
- d) Escoriações distais.

23) Com base no Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2016, aos 04 anos de idade a criança deverá tomar as seguintes doses de vacinas:

- a) 1ª dose de febre amarela, 2ª dose de DTP e 2º reforço de VOP.
- b) Reforço de febre amarela, 2º reforço de DTP e dose única de tetra viral.
- c) Reforço de febre amarela, 2º reforço de tríplice bacteriana e 2º reforço de VOP.
- d) Tríplice viral, 1ª dose de febre amarela e 2ª dose de DTP.

24) Qual a conduta vacinal para uma criança de 05 anos ou mais que reside no Brasil e vai para outro país com recomendação da vacinação contra poliomielite, sendo que esta já possui quatro doses de VOP com a última dose tendo sido administrada a mais de 12 meses?

- a) Administrar uma dose de reforço de VIP.
- b) Administrar uma dose de reforço de VIP e 15 dias após uma dose de VOP.
- c) Não administrar mais doses da vacina, pois a criança já está imunizada.
- d) Administrar uma dose de VOP somente se a criança estiver com a imunidade comprometida.

25) Seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunização, as vacinas que podem ser administradas na hipoderme são:

- a) BCG e Febre Amarela.
- b) Febre Amarela e SCR.
- c) Febre amarela e Insulina.
- d) Pneumocócica e BCG.

26) São procedimentos que devem ser adotados para a administração de insulina:

- a) Na combinação de dois tipos de insulinas, aspirar primeiramente a insulina NPH e em seguida a insulina regular.
- b) Sempre realizar a antissepsia da pele com álcool.
- c) Pinçar com dois dedos para a formação da prega cutânea, não sendo necessário puxar o êmbolo para verificar a presença de sangue após a introdução da agulha.
- d) Manter um mesmo local de aplicação das doses de insulina para minimizar os riscos de lipodistrofia.

27) O Diabetes Mellitus pode ter como complicação, exceto:

- a) Isquemia de membros inferiores.

- b) Lesões por pressão.
- c) Complicações oftalmológicas.
- d) Hipoglicemia.

28) A posição prona cada vez mais utilizada no tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo pode ter como complicações, exceto:

- a) Aumento na pressão parcial de oxigênio.
- b) Extubação acidental.
- c) Pneumotórax.
- d) Lesão por pressão na língua.

29) Julgue os itens abaixo usando (V) para verdadeiro e (F) para falso de acordo com os procedimentos necessários para manutenção da Sonda Enteral, e marque a sequência correta:

- Avaliar a cavidade oral e realizar higiene oral a cada 6 horas.
- Lavar a sonda com 20 ml de água antes e após a administração de dieta e medicamentos.
- Introduzir a sonda em copo com água para avaliar seu correto posicionamento.
- Reposicionar a fixação do tubo a cada 24 horas ou quando necessário.

- a) V, V, F, F
- b) F, F, V, F
- c) F, V, F, V
- d) V, V, F, V

30) Os quimioterápicos antineoplásicos possuem propriedades mutagênicas e carcinogênicas, podendo ainda causar reações alérgicas ou lesões locais. Em caso de derramamento de quimioterápico em superfícies, como o profissional Técnico de Enfermagem deve agir:

- a) Retirar o excesso da droga com compressa e descartar no saco branco com símbolo de lixo hospitalar.
- b) Devidamente paramentado retirar o excesso da droga, lavar o local com água e detergente hospitalar e secar, descartando compressas, avental e luva.
- c) Após a limpeza terminal do local afetado pelo derramamento, informar a equipe de saúde da interdição do espaço por 24 horas.
- d) Remover o quimioterápico com compressa e iodo, descartando no saco de lixo tóxico.

31) O meio mais rápido para esterilização de artigos termossensíveis com baixa toxicidade é:

- a) Óxido de etileno.
- b) Formaldeído gasoso.
- c) Plasma de Peróxido de hidrogênio.
- d) Ácido Peracético.

32) O conjunto de técnicas utilizadas para evitar a instalação de microrganismos em locais onde eles ainda não existem é chamado de:

- a) Degermação.
- b) Desinfecção.
- c) Antissepsia.
- d) Assepsia.

33) A oximetria de pulso é o parâmetro responsável por aferir o nível de saturação de oxigênio nas células sanguíneas. Dentre as alternativas abaixo assinale a que não apresenta um fator de interferência neste método de aferição.

- a) Acesso venoso.
- b) Hipotermia.
- c) Fontes externas de luz.
- d) Esmalte de unha.

34) Na interação medicamentosa, quando o efeito na combinação de duas medicações é superior ao efeito proporcionado por cada medicação separadamente denomina-se:

- a) Efeito idiosincrático.
- b) Efeito colateral.
- c) Efeito sinérgico.
- d) Efeito anafilático.

35) A Oxigenoterapia hiperbárica ao longo dos anos vem demonstrando sua eficácia no tratamento de feridas crônicas. Por outro lado ela apresenta algumas contra-indicações. Assinale a alternativa que possui uma contra-indicação absoluta do uso deste tipo de tratamento:

- a) Infecções de vias aéreas superiores.
- b) Pneumotórax não tratado.
- c) Claustrofobia.
- d) Convulsões.

36) São complicações relacionadas ao uso de Cateter Venoso Central, exceto:

- a) Tamponamento Cardíaco.
- b) Tromboflebitis.
- c) Embolia Pulmonar.
- d) Pericardite.

37) De acordo com a técnica para desenvolvimento da limpeza concorrente, assinale a alternativa correta:

- a) Movimentos circulares.
- b) Do mais limpo para o mais sujo.
- c) De baixo para cima.
- d) Do mais sujo para o mais limpo.

38) De acordo com a terminologia científica, hematêmese significa:

- a) Sangramento nasal.
- b) Tosse com sangue.
- c) Vômito com sangue.
- d) Fezes com sangue.

39) As áreas do Centro Cirúrgico em que é permitido a circulação de pessoal e equipamentos, de modo a não interferir no controle e na manutenção da assepsia cirúrgica é denominada:

- a) Área restrita.
- b) Área mista.
- c) Área semirrestrita.
- d) Área livre.

40) Jogue os itens abaixo de acordo com os estágios do Choque, assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida marcando a alternativa correspondente.

- () Estágio I: o paciente pode ser assintomático, com taquicardia e ligeira vasoconstrição.
- () Estágio II: Ocorre elevação da pressão sanguínea e hipoperfusão dos órgãos.
- () Estágio III: os mecanismos compensadores reagem e o paciente sente uma falsa sensação de que está se reestabelecendo.

- a) V, F, V.
- b) F, V, F.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F.

**GABARITO PRELIMINAR DA PROVA PARA TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
PROCESSO SELETIVO STT – 2016/2017**

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	B	21	C
02	B	22	B
03	D	23	C
04	D	24	A
05	C	25	B
06	C	26	C
07	NULA	27	D
08	D	28	A
09	B	29	D
10	B	30	B
11	C	31	C
12	B	32	D
13	D	33	A
14	A	34	C
15	C	35	B
16	A	36	D
17	D	37	B
18	A	38	C
19	B	39	C
20	B	40	D